

	Curación micológica ¹	Tasa de curación completa ¹
Ony-Tec®	89,1%*	12,7%
CPX no hidrosoluble	90,0%*	5,8%

	Curación micológica ²	Tasa de curación completa ²
Ony-Tec®	96,7%	35%
Amorolfina	86,7%	11,7%

	Curación micológica ³	Tasa de curación completa ³
Ony-Tec®	27%*	11,1%*
Otro Ciclopirox hidrosoluble	32%*	10,4%

La tasa de curación completa se define como la conversión a negativo tanto de la microscopía con KOH como del cultivo fúngico y el crecimiento del 100 % de una uña sana; Curación micológica se define como la conversión a negativo de ambas pruebas.

*No significativo.

1. Baran R, Tosti A, Hartmane I, Altmeyer P, Hercogova J, Koudelkova V, et al. An innovative water-soluble biopolymer improves efficacy of ciclopirox nail lacquer in the management of onychomycosis. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2009 Jul;23(7):773–81. doi:10.1111/j.1468-3083.2009.03164.x. 2. Iorizzo M, Hartmane I, Derveniece A, Mikazans I. Ciclopirox 8% HPCH nail lacquer in the treatment of mild-to-moderate onychomycosis: a randomized, amorolfine controlled study using a blinded evaluator. Skin Appendage Disord. 2015;1(3):134–140. doi:10.1159/000441569. 3. Zalacain-Vicuña AJ, Nieto C, Picas J, Martínez H, Bermejo R, Corrales A, et al. Efficacy and safety of a new medicated nail hydrolacquer in the treatment of adults with toenail onychomycosis: a randomized clinical trial. Mycoses. 2023. doi:10.1111/myc.13543.

Ony-Tec[®]

Ciclopirox 80 mg/g

Único **Ciclopirox**
con **Hidroxipropil**
Chitosán¹



Eficacia superior

a otros barnices de uñas^{*2,3}



Hidrosoluble

Eliminación mediante lavado con agua¹



*En comparación con otros barnices de uñas con ciclopirox 8% en formulación no soluble y amorolfina 5%.

1. AEMPS. Ficha técnica de Ony-Tec[®] 80 mg/g barniz de uñas medicamentoso. Fecha de revisión del texto: Enero de 2025. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/72143/FT_72143.html. 2. Iorizzo M, Hartmane I, Derveniece A, et al. Ciclopirox 8% HPCH Nail Lacquer in the Treatment of Mild-to-Moderate Onychomycosis: A Randomized, Amorolfine Controlled Study Using a Blinded Evaluator. Skin Appendage Disord. 2015;1(3):134-40. 3. Baran R, Tosti A, Hartmane I, et al. An innovative water-soluble biopolymer improves efficacy of ciclopirox nail lacquer in the management of onychomycosis. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2009;23(7):773-81.

Accede a la ficha
técnica de Ony-Tec®



Ony-Tec® 80 mg/g barniz de uñas
medicamentoso, frasco de 6,6 ml.
Medicamento sujeto a receta médica.
Medicamento financiado por el SNS.
PVP IVA: 16,59 € C.N. 669362.
Fecha de elaboración: julio 2025.