




Resultados del estudio TIRBASKIN sobre el uso de **KLISYRI®** en la práctica clínica real^{1,2}

▼ Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas de reacciones adversas asociadas a este medicamento.


LA REDUCCIÓN PROMEDIO DE LAS LESIONES RESPECTO A BASAL FUE DEL **82 % EN EL DÍA 57¹**

ACLARAMIENTO PARCIAL Y COMPLETO EN EL DÍA 57¹



*El aclaramiento parcial se define como una reducción ≥ 75 % (incluye a los pacientes con aclaramiento completo).

LOCALIZACIÓN DE LA QA¹



QA: queratosis actínica.

ACLARAMIENTO EN UNA PACIENTE TRATADA CON KLISYRI® *,†,3



VISITA BASAL

VISITA A LOS 40 DÍAS

*Según instrucciones de Ficha Técnica, KLISYRI® se administra 1 vez al día durante 5 días consecutivos.⁴

†Imágenes de una paciente en práctica clínica real Benedicto MD, *et al.* Póster presentado en 35 Reunión GEDOC, 9-11 Noviembre 2023. P22008.

87% DE LOS MÉDICOS REPORTARON QUE VOLVERÍAN A USAR **KLISYRI**® EN EL FUTURO²

Los médicos participantes completaron el Expert Panel Questionnaire (EPQ) el día 57. Los resultados fueron:



La satisfacción general con **KLISYRI**® fue alta y **tanto investigadores como pacientes** reportaron una **alta predisposición a volver a usarlo en el futuro**, considerándolo una **opción terapéutica de valor** en el tratamiento de la QA.²

KLISYRI® MEJORA LA APARIENCIA COSMÉTICA PERCIBIDA
EN EL ÁREA TRATADA PARA LA QA^{*,†,5}



VISITA BASAL

VISITA A LAS 8 SEMANAS

QA: queratosis actínica.


^{*}Según instrucciones de Ficha Técnica, KLISYRI® se administra 1 vez al día durante 5 días consecutivos.⁴

[†]Imágenes de una paciente en práctica clínica real Liñán J, *et al.* Póster presentado en 36 Reunión GEDOC, 14-15 Febrero 2025. P22132.

EL ESTUDIO TIRBASKIN CONCLUYE QUE **KLISYRI®** ES **EFFECTIVO, SEGURO Y BIEN TOLERADO**, CONSISTENTE CON ENSAYOS PIVOTALES¹

SIGNOS DE TOLERABILIDAD LOCAL EN EL DÍA 8¹

Leve Moderado



El 98 % de los pacientes experimentaron al menos un tipo de STL en el día 8, siendo en su mayoría **leves o moderados**, como **eritema (72,3 %)**, **descamación (34,6 %)** y **costras (18,8 %)**.^{*,1}



KLISYRI®, al no ser fotosensible, **permite ser pautado en los meses de mayor exposición solar.**⁶

STL: signos de tolerabilidad local.

*En su mayoría se habían resuelto en el día 57 sin requerir tratamiento adicional.¹

UN **89,3 %** DE LOS PACIENTES REPORTARON ESTAR
EXTREMADAMENTE SATISFECHOS* CON LA MEJORÍA
EN EL ASPECTO DE LA PIEL TRAS EL TRATAMIENTO CON **KLISYRI®**²



KLISYRI® fue considerado como “mucho/algo”
mejor comparado con tratamientos tópicos previos
por un **87,7 % de médicos** y un **81,8 % de pacientes**²



Alta probabilidad de reconsiderar KLISYRI® en el futuro
por parte de **médicos (87,1 %) y pacientes (86,3 %)**²

*O muy satisfechos/satisfechos.

1. Gilaberte Y, *et al.* Póster presentado en 36 Reunión GEDOC, 14-15 Febrero 2025. P22155. 2. Cañueto J, *et al.* Póster presentado en 36 Reunión GEDOC, 14-15 Febrero 2025. P22154. 3. Benedicto MD, *et al.* Póster presentado en 35 Reunión GEDOC, 9-11 Noviembre 2023. P22008. 4. Ficha Técnica Klisyri®. Almirall. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/p/1211558001/P_1211558001.html. Último acceso: Abril 2025. 5. Liñán J, *et al.* Póster presentado en 36 Reunión GEDOC, 14-15 Febrero 2025. P22132. 6. Schlesinger T, *et al.* JDD. 2024;23(5):338-46.

KLISYRI® ES EFECTIVO, SEGURO Y BIEN TOLERADO¹, CON UNA SATISFACCIÓN GENERAL ALTA²

EFICACIA¹

Aclaramiento
completo

54 %

Aclaramiento
parcial

77 %

MEJORA DE LA PIEL²

96 %

De los médicos
reportaron una
**mejora de la
apariciencia de
la piel** de los
pacientes

TOLERABILIDAD¹



Sin **eventos
adversos graves**

SATISFACCIÓN²

87,7 %

De los médicos
reportaron una
satisfacción global
“mucho/algo”
mejor **comparada
con tratamientos
previos**



Régimen
sencillo que
favorece la
adherencia⁶



Presentación 5 sobres
de 250 mg y PVP (IVA):
75,95 €. Con receta
médica. Dispensación en
farmacias. Incluido en la
prestación farmacéutica
del S.N.S. con visado
de inspección.⁴



Ver Ficha Técnica del medicamento.