

EFICACIA con buena TOLERABILIDAD^{1,2}



▼ Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas de reacciones adversas asociadas a este medicamento.

LA ELECCIÓN DEL TRATAMIENTO DEBE BASARSE EN MÚLTIPLES FACTORES⁴



Eficacia



Coste



Tolerabilidad



Perfil de riesgo del paciente



Resultados estéticos

I En un consenso publicado en el que participaron 73 dermatólogos:

94 %

El **94 %** coincidió en que el valor del tratamiento para la QA está en el **equilibrio entre una buena eficacia,**

posología corta, reacciones cutáneas locales leves/moderadas

y ausencia de fotosensibilidad.^{†,5}

[†]Estudio Delphi modificado realizado con 73 dermatólogos de Alemania, Italia y España para comprender sus perspectivas sobre los tratamientos tópicos para la QA. El objetivo del estudio fue alcanzar un consenso sobre la toma de decisiones clínicas en el tratamiento de la QA, basándose en la literatura publicada y la opinión de expertos. Un comité científico elaboró un cuestionario de 27 afirmaciones, dividido en 5 bloques temáticos, que fue completado por los dermatólogos.⁵

KLISYRI® LOGRÓ UNA **REDUCCIÓN** PROMEDIO DE APROXIMADAMENTE **8 DE CADA 10 LESIONES** EN UN ESTUDIO EN **VIDA REAL**^{*,†,1}



54,3%

El **54,3 %**
de los pacientes
alcanzó un
**aclaramiento
completo**
el día 57 tras
el tratamiento
con **KLISYRI**^{*,1}



*TIRBASKIN: estudio clínico fase IV, multicéntrico, de una sola cohorte, de baja intervención, realizado en España e Italia en 328 adultos con QA, en el que se evaluó la eficacia mediante el porcentaje de pacientes con aclaramiento completo (100 %) o aclaramiento parcial, definido como una reducción de al menos el 75 % del número de lesiones dentro del área de aplicación, en el día 57, y el porcentaje de CFB en el recuento de lesiones de QA. La seguridad se evaluó mediante la incidencia y gravedad de los EA y los STL. La satisfacción con el tratamiento se midió mediante el TSQM-9 y el EPQ.^{1,7}

[†]Reducción promedio del 82 % en el número de lesiones en el día 57 en un estudio en vida real.¹

SOBRE EL ENFOQUE SECUENCIAL:⁵

86%

En un consenso publicado en el que participaron 73 dermatólogos, el **86 %** coincidió en que, en pacientes con un campo de cancerización con **lesiones de grado heterogéneo**, podría considerarse un **ENFOQUE SECUENCIAL** que incluya:⁵

1


Tratamientos dirigidos a las lesiones como la crioterapia o 5-FU al 0,5 % con AS (Actikerall®)

2

Y un **tratamiento del campo de cancerización $\leq 25 \text{ cm}^2$** como **KLISYRI®***

1

Tratamiento dirigido a la lesión⁵



- Crioterapia
- 5-FU al 0,5 % + AS (Actikerall®)

2

Tratamiento del campo de cancerización ($\leq 25 \text{ cm}^2$)⁵



KLISYRI®

*Siempre que se cumplan los requisitos de ficha técnica.³

SATISFACCIÓN DEL PACIENTE^{5,8,9}




KLISYRI® ha demostrado **la mayor tasa de adherencia** de todos los tratamientos para la QA⁵



Su **alta tolerabilidad** y la **corta duración del tratamiento** (5 días), convierten a **KLISYRI®** en la **opción preferida** para pacientes con QA⁵

Satisfacción con la mejoría de “cómo se ve la piel” en el día 57⁸



Cañueto J, et al. GEDOC. 2025.⁸



La queratosis actínica **afecta a distintos aspectos de la vida de los pacientes**. Por eso, las estrategias terapéuticas deben **adaptarse a sus preferencias para lograr la máxima satisfacción con el tratamiento**.⁹

RESULTADOS COSMÉTICOS⁵



KLISYRI®, además de eliminar lesiones de QA e incluso el lentigo, **mejora el aspecto de la piel fotoenvejecida**, por lo que podría ser una **opción adecuada para pacientes con preocupaciones estéticas.**⁵



KLISYRI®, además de sus resultados en QA logró una **reducción de la pigmentación moteada y el blanqueamiento cutáneo**, beneficios que no se han observado con ninguna otra terapia para el tratamiento de la QA.⁶



ESTUDIO LI POMI⁶ 

Beneficios cosméticos
 como consecuencia del
 tratamiento para la QA



Esta serie de casos confirma que **KLISYRI® es eficaz en el tratamiento de las lesiones de QA** y que también ofrece **beneficios destacables en términos de mejora de aspectos relacionados con la edad de la piel.**⁶



Los pacientes observados en experiencia en vida real mostraron una gran **mejoría de la textura de la piel y una reducción de las arrugas y, sobre todo, de las lesiones pigmentadas** después de la terapia.⁶



KLISYRI® parece mejorar el envejecimiento de la piel fotodañada con lesiones de QA **como un efecto secundario favorable** en el área de aplicación.⁶

Abreviaturas: **5-FU:** fluorouracilo; **AS:** ácido salicílico; **CFB:** *Change From Baseline* (cambio desde el valor basal); **EA:** evento adverso; **EPQ:** *Expert Pannel Questionnaire*; **QA:** queratosis actínica; **SNS:** Sistema Nacional de Salud; **STL:** signos de tolerabilidad local; **TSQM-9:** *Treatment Satisfaction Questionnaire for Medication Version 9*.

Referencias: **1.** Gilaberte Y, Yélamos O, Cañueto J, *et al.* Eficacia y seguridad de la tirbanibulina al 1 % para el tratamiento de la queratosis actínica en condiciones cercanas a la práctica clínica habitual en España e Italia (estudio TIRBASKIN). Póster presentado en la 36 Reunión GEDOC, 14 - 15 febrero, 2025. P22155. **2.** Gilaberte Y, Yélamos O, Cañueto J, *et al.* Eficacia y tolerabilidad de tirbanibulina al 1 % para la queratosis actínica en la cara y el cuero cabelludo y satisfacción de los pacientes y médicos con el tratamiento (estudio TIRBASKIN). Póster presentado en el 52 Congreso AEDV, 7 - 10 mayo, 2025. P7092. **3.** Ficha Técnica de Klisyri®. Almirall. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/1211558001/FT_1211558001.html. Último acceso: Julio 2025. **4.** Piquero-Casals J, Morgado-Carrasco D, Gilaberte Y, *et al.* Management Pearls on the Treatment of Actinic Keratoses and Field Cancerization. *Dermatol Ther* (Heidelberg). 2020;10:903-15. **5.** Dirschka T, Ardigò M, Fargnoli MC, *et al.* Reshaping treatment paradigm in actinic keratosis by using a modified Delphi questionnaire. *J Dermatolog Treat*. 2025;36(1):2487657. **6.** Li Pomi F, Peterle L, d'Aloja A, *et al.* Anti-aging Effects of Tirbanibulin 1% Ointment: A Real-Life Experience. *Dermatol Ther* (Heidelberg). 2024;14:1683-96. **7.** Gilaberte Y, Yélamos O, Cañueto J, *et al.* Patient and physician-reported outcomes with tirbanibulin 1% ointment for actinic keratosis in routine clinical practice in Spain and Italy (TIRBASKIN study). Póster presentado en el Congreso EADO, 4 - 6 Abril 2024. P304. **8.** Cañueto J, Gilaberte Y, Yélamos O, *et al.* Resultados reportados por pacientes y médicos con tirbanibulina al 1 % para el tratamiento de la queratosis actínica en condiciones cercanas a la práctica clínica habitual en España e Italia (estudio TIRBASKIN). Póster presentado en la 36 Reunión GEDOC, 14 - 15 febrero, 2025. P22154. **9.** Lang BM, Zielbauer S, Stege H, *et al.* If patients had a choice—Treatment satisfaction and patients' preference in therapy of actinic keratoses. *JDDG*. 2024;22(10):1362-8. **10.** Schlesinger T, Kiricik L, Lebowitz M, *et al.* Patient and Clinician-Reported Outcomes for Tirbanibulin in Actinic Keratosis in Clinical Practice Across the United States (PROAK). *JDD*. 2024;23(5):338-46. **11.** Ficha Técnica Actikerall®. Almirall. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/77675/77675_ft.pdf. Último acceso: Julio 2025.



KLISYRI® logró una **reducción** promedio de aproximadamente **8 de cada 10 lesiones***¹



El **89,3 %** de los pacientes mostró una **alta satisfacción** con la **mejoría en el aspecto de la piel** tras el tratamiento con **KLISYRI®**⁸



KLISYRI® parece mejorar el **aspecto de la piel fotoenvejecida** como efecto secundario favorable del tratamiento para la QA⁶



Sin **eventos adversos graves**¹



Régimen **sencillo** que favorece la **adherencia**¹⁰



[Ver Ficha Técnica del medicamento.](#)

Presentación 5 sobres de 250 mg y PVP (IVA): 75,95 €. Con receta médica. Dispensación en farmacias. Incluido en la prestación farmacéutica del SNS con visado de inspección.³



[Ver Ficha Técnica del medicamento.](#)

Presentación y PVP (IVA M.R.): Actikerall® 5 mg/g + 100 mg/g solución cutánea, envase con 25 ml: 68,45 €. Medicamento sujeto a prescripción médica. Especialidad reembolsable por el SNS con aportación reducida.¹¹

*Reducción promedio del 82 % en el número de lesiones en el día 57 en un estudio en vida real.¹